

|                                                                                                                                                        |                                                 |                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  <p><b>JUAN PABLO II</b><br/>CEDI SALUD FAMILIAR - I.P.S. - S.A.S.</p> | <b>RECOMENDACIÓN<br/>NASOFIBROLARINGOSCOPIA</b> | <b>CODIGO</b>              | INS-OTO-001   |
|                                                                                                                                                        |                                                 | <b>FECHA DE APROBACION</b> | 30/05/2017    |
|                                                                                                                                                        |                                                 | <b>VERSION</b>             | 1             |
|                                                                                                                                                        |                                                 | <b>PAGINA</b>              | Página 1 de 1 |

## NASOFIBROLARINGOSCOPIA

- Debe asistir acompañado.
- No es necesario tomar ningún medicamento previo. Se deben comunicar al médico todas las medicinas que se toman habitualmente, y él decidirá cuáles suspender o mantener. Se debe evitar tomar medicamentos que dificulten la coagulación de la sangre las dos semanas previas a la cistoscopia si se realiza alguna intervención quirúrgica, como la aspirina, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios.
- Debe tener 2 horas de ayuno, no ser alérgico a la Xilocaina.
- Retirar prótesis dental, no tomar nada 1 hora después del examen.
- Firmar consentimiento informado.